


## 栽培時期ごとの散布。それが基本です。

主な栽培時期（生育ステージ①～④）ごとに散布し、効率の良い使い方をしましょう。  
特に、葉の老化や傷みを抑制したい場合は、散布回数を多めにしてください。  
（混用散布の場合は、対象薬剤の注意書きを良く読んでください。）



## 「ヤワラ」混用のススメ！

展着促進材入りカルシウム剤「ヤワラ」と「アグリボEX」の相性は抜群です。  
干ばつや雨上がり後の生育障害の予防に。また、アグリボ成分の効率的な浸透によって、アグリボ効果を引き立てます。

天候不順が予想される場合、「アグリボEX」の代わりに“光触媒”入り「アグリボ3」の3,000倍希釈液の散布が有効です。

「アグリボEX」や「アグリボ3」を葉面散布する際、“展着促進材”（界面活性剤・トレハロース）入り「ヤワラ」を1,000倍希釈相当で加用すると、散布液の展着性向上に効果的です。

ご質問 フリーダイヤル イーハナ イーヤサイ アグリボ  
ご相談 **0120-187-183** 相談室

# AGREVO

<http://www.agrevo.co.jp/>

株式会社アグリボ 〒240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町528  
TEL:045-352-5327 FAX:045-352-5328