


使用ポイントは、育苗～収穫開始

きゅうりは成り疲れを避けられない作物です。

成り疲れを軽減するには、初期生育の発根と樹作り、収穫期の根の活性が重要です。収穫開始までは「アグリボEX」、収穫開始からは「森羅」で樹と根を作ってください。



落下傘葉対策に、ヤワラ！

乾燥や急激な水分変化などで、根からのカルシウム吸収が困難になります。

そんな時は、葉面からの吸収効率が高い「ヤワラ」を1,000倍に希釈して散布して下さい。

萎れ対策に、森羅・ヤワラ！

「森羅」は根を張らせる力が強い製品です。今まで、根にコブが付いていても新根を出させた報告が数多く上がっています。根が弱って萎れている時には、早めに「森羅」で対応を！

また、着果後の「ヤワラ」の定期的散布で、萎れを防ぎ異常果を減らすことができます。

天候不順が予想される場合、「アグリボEX」の代わりに“光触媒”入り「アグリボ3」の3,000倍希釈液の散布が有効です。

「アグリボEX」や「アグリボ3」を葉面散布する際、“展着促進材”(界面活性剤・トレハロース)入り「ヤワラ」を1,000倍希釈相当で加用すると、散布液の展着性向上に効果的です。

ご質問 フリーダイヤル イーハナ イーヤサイ アグリボ
ご相談 **0120-187-183** 相談室

AGREVO

<http://www.agrevo.co.jp/>

株式会社アグリボ 〒240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町528
TEL:045-352-5327 FAX:045-352-5328