


## 定植前の灌水散布と、定植後の2回散布

レタスは初期生育が重要。

定植後の発根に気を配り、りん酸をしっかりと吸わせ、その後の生育を整えましょう。



### 定植後の発根に、アグリボEX!

定植後の低温などによる発根不良は、生育の遅れや生理障害の原因になります。

定植後の活着をスムーズにし、定植後1ヶ月以内にしっかりと根を張らせてください。

### チップバーン対策に、ヤワラ!

乾燥や高温などにより、根からのカルシウム吸収が困難になり発生します。それからでは手遅れなので、小さい時期から「ヤワラ」を使って予防しましょう。  
(1,000倍に希釈して、7~10日おきの定期散布)

天候不順が予想される場合、「アグリボEX」の代わりに“光触媒”入り「アグリボ3」の3,000倍希釈液の散布が有効です。

「アグリボEX」や「アグリボ3」を葉面散布する際、“展着促進材”(界面活性剤・トレハロース)入り「ヤワラ」を1,000倍希釈相当で加用すると、散布液の展着性向上に効果的です。

ご質問 フリーダイヤル イーハナ イーヤサイ アグリボ  
ご相談 **0120-187-183** 相談室

# AGREVO

<http://www.agrevo.co.jp/>

株式会社アグリボ 〒240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町528  
TEL:045-352-5327 FAX:045-352-5328