


マルチがけまでの株作りと、厳寒期の根の動き

収穫期の株疲れは、葉の展開を遅らせ出雷までに時間がかかります。株疲れを最小限に抑えるためには、収穫開始までの株作りと低温期の根の活性が必要です。マルチがけまでに「アグリボEX」、収穫開始から「森羅」で株と根を作ってください。



厳寒期は温度と湿度を十分に!

厳寒期に葉の展開を早めるためには十分な温度が必要になりますが、その際乾燥状態の高温は禁物。灌水を十分におこない、ハウス内の湿度を保つように心がけて下さい。

チップバーン対策に、ヤワラ!

乾燥や高温などにより、根からのカルシウム吸収が困難になり発生します。そんな時は、葉面からの吸収効率が高い「ヤワラ」を1,000倍に希釈して予防散布して下さい。

天候不順が予想される場合、「アグリボEX」の代わりに“光触媒”入り「アグリボ3」の3,000倍希釈液の散布が有効です。

「アグリボEX」や「アグリボ3」を葉面散布する際、“展着促進材”(界面活性剤・トレハロース)入り「ヤワラ」を1,000倍希釈相当で加用すると、散布液の展着性向上に効果的です。

ご質問 フリーダイヤル イーハナ イーヤサイ アグリボ
ご相談 **0120-187-183** 相談室

AGREVO

<http://www.agrevo.co.jp/>

株式会社アグリボ 〒240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町528
TEL:045-352-5327 FAX:045-352-5328